Physiologie musculaire et osseuse

Luís Carlos Pereira
EPSN 2016-2017

lucaspereira@netbo.pt
[@megustatuperro](https://twitter.com/megustatuperro)

- I) Propriétés biologiques
- II) Phénomènes biologiques
- III) Description du muscle
- IV) Sources d'énergies

I) Propriétés biologiques

- A. L'excitabilité
- B. La contractilité
- C. L'élasticité
- D. La tonicité

I) Propriétés biologiques

A. L'excitabilité

L'excitabilité :

propriété que possède le muscle de répondre à un stimulus.

Contraction par excitation mécanique, chimique, thermique, électrique (excitant idéal).

Le muscle est excité par un nerf venant d'un courant électrique (influx nerveux) qui règle l'intensité et la durée de la contraction.

Chronaxie: rapport entre intensité liminaire (seuil d'excitation minimum) et durée d'excitation.

- muscle à chronaxie basse: muscle rapide
- muscle à chronaxie haute: muscle lent

Loi du tout ou rien: le muscle se contracte ou non.

La puissance d'un muscle reste toujours la même quelque soit l'intensité.

I) Propriétés biologiques

A. L'excitabilité
B. La contractilité

La contractilité:

faculté que possède le muscle de se raccourcir, donc de rapprocher ses extrémités et de déplacer les éléments de la structure.

Les différentes phases de la contractilité :

- 1. Phase de latence** : temps qui s'écoule entre l'évolution de la stimulation nerveuse et le début de la contraction musculaire.
- 2. Phase de contraction**: raccourcissement du muscle
- 3. Phase rétractaire**: le muscle ne répond pas, récupération du muscle

I) Propriétés biologiques

A. L'excitabilité
B. La contractilité
C. L'élasticité

I) Propriétés biologiques

A. L'excitabilité
B. La contractilité
C. L'élasticité
D. La tonicité

La tonicité :

propriété de maintien, en dehors de tout mouvement, d'un état de tension.

- Tonus musculaire: état de légère contraction permanente involontaire
- La tonicité dépend des connexions nerveuses. En l'absence de ces connexions ou de mauvais fonctionnement de celles-ci le muscle peut perdre son tonus, il devient ainsi mou et ne peut plus se contracter, ce phénomène engendre la paralysie.

II) Phénomènes biologiques**II) Phénomènes biologiques****A. Phénomènes thermiques****A. Phénomènes thermiques**

- Tout muscle qui se contracte produit de la chaleur.
- 80 % du muscle est utilisé pour produire de la chaleur. Elle est utilisée pour le maintien de la température corporelle.
- Lors d'activités physiques intenses, une élévation dangereuse de la température se produit. Il y a alors évacuation de l'excédent par sudation (afflux de sang vers la peau).
- Le frisson est un mécanisme de réchauffement.

II) Phénomènes biologiques**A. Phénomènes thermiques****B. Phénomènes électriques****B. Phénomènes électriques**

- Différence de potentiel entre la surface du muscle (chargé +) et l'intérieur du muscle (chargé -).
- Cette différence de potentiel diminue et peut même s'inverser lors d'un effort (dépolarisation qui se fait le long des nerfs).

II) Phénomènes biologiques

A. Phénomènes thermiques

B. Phénomènes électriques

C. Phénomènes hormonaux

C. Phénomènes hormonaux

- Libération au niveau de la plaque motrice (jonction entre le nerf et le muscle) d'une hormone qui est en fait un médiateur chimique : **L'acétylcholine**.

II) Phénomènes biologiques

A. Phénomènes thermiques

B. Phénomènes électriques

C. Phénomènes hormonaux

D. Phénomènes mécaniques

D. Phénomènes mécaniques

- Lorsque le muscle se contracte il effectue un travail. Ce travail est enregistrable grâce à un ergographe ou ergomètre.
- **Contraction isotonique**: raccourcissement du muscle, il s'agit d'un travail dynamique.
- **Contraction isométrique**: il n'y a pas de variation de longueur, il s'agit d'un travail statique.

II) Phénomènes biologiques

A. Phénomènes thermiques

B. Phénomènes électriques

C. Phénomènes hormonaux

D. Phénomènes mécaniques

E. Phénomènes chimiques

E. Phénomènes chimiques

- Une contraction musculaire entraîne une dépense énergétique.
- Lors d'importantes dépenses énergétiques le muscle utilise de l'oxygène mais aussi des éléments de stockage tels que le glycogène et plus rarement les lipides et acides gras.
- Apparition d'acide lactique (déchet du glycogène) par les oxydations.

L'énergie chimique est fournie par la dégradation d'ATP (adénosine triphosphate).

- L'hydrolyse se fait à partir des composés phosphorés ATP-ADP.

III) Description du muscle

III) Description du muscle

A. Les différents types de tissu musculaire

A. Les différents types de tissu musculaire

3 types

1. Tissu musculaire squelettique
2. Tissu musculaire cardiaque
3. Tissu musculaire lisse

Muscle squelettique (strié)

- Longues cellules cylindriques (qq mm à 30 cm)
- Diamètre 10 microns à 0,1 mm.
- Multinucléées (parfois plus de 100 nx).
- Relient les différentes parties du squelette grâce à un ou plusieurs tendons de tissu conjonctif.
- Durant la contraction musculaire, le muscle squelettique raccourcit et déplace les différentes parties du squelette.
- Grâce à une activation graduée des muscles, la vitesse et la douceur d'un mouvement peuvent varier.
- Contractions lentes (fibres rouges) ou rapides (fibres blanches).
- Ils obéissent à la volonté (activation volontaire).
- L'activation répétée d'un muscle squelettique peut entraîner la fatigue.

Muscle strié squelettique:

Les muscles lisses

- Situés dans les vaisseaux sanguins, la voie respiratoire, l'iris de l'œil et la voie gastro-intestinale.
- Les contractions sont lentes et uniformes.
- Fusiformes et mononucléées
- Absence de stries
- Leur fonction : modifier l'activité de plusieurs parties du corps afin de répondre à des besoins ponctuels.
- Ils ont une bonne résistance à la fatigue.
- Leur activation est involontaire.

	Squelettique	Cardiaque	Lisse
Où ?	Recouvre le squelette osseux	Cœur	Dans les parois des organes viscéraux (estomac, vessie) et les organes des voies respiratoires
Strié ?	Oui	Oui	Non
Volontaire ou involontaire ?	Volontaire	Involontaire	Involontaire
Contraction ...	Peut se contracter rapidement mais se fatiguent facilement	Se contracte à un rythme relativement constant	Contractions lentes et continues (se fatigue pas)
Couleur	rouge	rouge	blanc

III) Description du muscle

A. Les différents types de tissu musculaire

B. Niveaux d'organisation du muscle

B. Niveaux d'organisation du muscle

- Du muscle (organe)
- Au faisceau (groupe de cellules)
- À la fibre musculaire (cellule)
- À la myofibrille (organite)
- Au sarcomère (section d'organite)
- Au myofilament (molécule protéique)

(a) Fibres à contraction lente

- Idéales pour les contractions répétées durant des activités nécessitant un apport physique inférieur à 20-25% de l'apport physique maximal.
- Exemples : activités à bas régime, endurance.

(b) Fibres à contraction rapide

- Capacité de force et de génération de vitesse plus élevée que celle des fibres à contraction lente (force explosive).
- Idéales pour les activités pratiquées à haut régime.
- Exemples : sprint, saut, lancer.

III) Description du muscle

A. Les différents types de muscle
B. Niveaux d'organisation du muscle

- Description macroscopique du muscle.

III) Description du muscle

A. Les différents types de muscle
B. Niveaux d'organisation du muscle

- Description macroscopique d'une f.m.

1. Enveloppe de tissu conjonctif
2. Innervation
3. Irrigation
4. Attaches
5. Agencement des faisceaux

III) Description du muscle

A. Les différents types de muscle

B. Niveaux d'organisation du muscle

- Description microscopique d'une f.m.

Les fibres musculaires

- Cellules de forme cylindrique qui composent le muscle squelettique
- Chaque fibre est composée de plusieurs myofilaments.
- Chaque fibre est entourée d'une membrane : un tissu conjonctif appelé sarcolemme.
- Un tissu conjonctif appelé périnysium regroupe différentes fibres pour former des faisceaux.
- Chaque fibre contient une machine contractile et des organites.
- Les fibres sont activées par influx nerveux via leur jonction neuro-musculaire.
- Un groupe de fibres activées par un même nerf forme une unité motrice.
- Chaque fibre a des capillaires qui apportent des nutriments et éliminent les déchets.

Description microscopique d'une fibre musculaire

Matrice extracellulaire

III) Description du muscle

A. Les différents types de muscle

B. Niveaux d'organisation du muscle

- Description microscopique d'une f.m.

1. Les myofibrilles

1. Les myofibrilles
= succession de **sarcomères** (plus petite unité contractile) sur toute leur longueur.

III) Description du muscle

A. Les différents types de muscle

B. Niveaux d'organisation du muscle

1. Les myofibrilles

2. Le sarcomère

2. Le sarcomère

Le sarcomère est la plus petite unité fonctionnelle de la myofibrille. longueur de 1.5 à 2 µm.

Constitué par l'assemblage des microfilaments d'actine et de myosine.

Description d'un sarcomère

Sarcomère = protéines contractiles + protéines de maintien

Vue microscopique grossie de sarcomères à l'intérieur d'une microfibrille:

2 µm

Strie A : filaments épais de myosine + des parties des filaments fins d'actine

Strie I : uniquement des filaments fins

Strie H : uniquement des filaments épais

Strie M : molécules protéiques reliant les filaments épais adjacents

III) Description du muscle

A. Les différents types de muscle

B. Niveaux d'organisation du muscle

1. Les myofibrilles
2. Le sarcomère
3. Le myofilament

3. Le myofilament

Filament épais = myosine
 Filament mince = actine

III) Description du muscle

A. Les différents types de muscle

B. Niveaux d'organisation du muscle

1. Les myofibrilles
2. Le sarcomère
3. Le myofilament
4. Autres structures

4. Autres structures

2 citernes terminales + 1 tubule transverse = **triade**

Principe du « tout-ou-rien »

- L'activation d'une unité motrice par un influx nerveux est générée selon le principe du « tout-ou-rien ».
- La contraction de toute fibre innervée ne se produit qu'à une certaine amplitude (ou force) d'influx nerveux.
- Pour chaque unité motrice, un seuil spécifique d'activation doit être atteint.

III) Description du muscle

A. Les différents types de muscle

B. Niveaux d'organisation du muscle

1. Les myofibrilles
2. Le sarcomère
3. Le myofilament
4. Autres structures
5. L'unité motrice
6. Théorie sur la contraction musculaire

6. La théorie de la contraction par glissement des filaments

Durant la contraction, les filaments minces glissent sur les filaments épais de sorte que l'actine et la myosine se chevauchent davantage.

Hugh Huxley
1954

La machine contractile : Complexe actine-myosine (CAM)

- **Formation du CAM :**
 - Un nerf moteur génère un stimulus, activant ainsi la fibre
 - Les têtes des filaments de myosine s'attachent temporairement aux filaments d'actine
- **Mouvement du CAM :**
 - Similaire au « coup » d'un aviron et au mouvement subséquent de l'embarcation
 - Glissement des fibres d'actine sur celles de myosine
 - Raccourcissement du sarcomère
 - Le raccourcissement de chaque sarcomère est additionnel

Video contraction scheme skeletal muscle
(2/14/03)

Excitation-Contraction Coupling

1. The action potential (excitation) travels over the sarcolemma, including T-tubules
2. Voltage sensors on the T-tubules cause corresponding SR receptors to open gated channels and release Ca^{2+} ions
3. Ca^{2+} binds to troponin, causing tropomyosin to move out of its blocking position
4. Myosin forms cross bridges to actin, the power stroke occurs, filaments slide, muscle shortens
5. **Calsequestrin and calmodulin** help regulate Ca^{2+} levels inside muscle cells

La machine contractile : Longueur optimale du muscle et angle d'articulation optimal

- La distance entre les sarcomères dépend de l'étirement du muscle et de la position de l'articulation.
- La force musculaire maximale s'observe à une longueur optimale du muscle.
- La force musculaire maximale s'observe à une angulation optimale du muscle.
- Une angulation optimale du muscle s'observe à une longueur optimale du muscle.

IV) Sources d'énergies

IV) Sources d'énergies

Le muscle devient un convertisseur d'énergie:

**ÉNERGIE CHIMIQUE (ATP) ⇒ MUSCLE
⇒ ÉNERGIE MÉCANIQUE**

<p>L'AÉROBIE :</p> <p>Sports d'endurance, Marathon, Cyclisme, Triathlon</p>	<p>L'ANAÉROBIE ALACTIQUE :</p> <p>Sports de puissance, vitesse, force Sprint, lancers, sauts</p>	<p>L'ANAÉROBIE LACTIQUE :</p> <p>Athlétisme 400m, natation 200m ... Sports de combat (judo lutte...)</p>
--	---	---

<p>L'AÉROBIE :</p> <p>C'est le système qui consiste à la dégradation des sucres et des acides gras dont les réserves sont considérables. Cette oxydation ne produit aucun déchet, si ce n'est l'eau et le gaz carbonique évacués en produisant de la chaleur. Les limites de cette filière, nommées la VO2 MAX, sont dépendantes de la capacité de l'organisme à prélever, transporter et distribuer l'oxygène nécessaire à l'exercice.</p>	<p>L'ANAÉROBIE LACTIQUE :</p> <p>Au delà de la consommation maximale d'oxygène (VO2MAX), l'intensité de l'exercice peut augmenter en faisant appel au processus de l'anaérobie lactique, qui est la dégradation du glycogène musculaire en acide lactique et dont l'accumulation au niveau des tissus en perturbe l'activité. Au fur et à mesure de la durée de l'effort, cette accumulation d'acide lactique pouvant conduire à une acidose, finit par stopper l'exercice.</p>
--	--

Une fois l'ATP hydrolysé en ADP, sa régénération se fait en une fraction de seconde suivant trois voies:

- Voie de la créatine phosphate**
 Par interaction de l'ADP avec la **créatine phosphate** (phosphocréatine)

$$\text{Créatine} + \text{ADP} \longrightarrow \text{ATP} + \text{Créatine}$$
- Voie aérobie : phosphorylation oxydative**
 Se produit dans les mitochondries – Nécessite la présence d'oxygène

$$\text{Glucose} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$$
- Voie anaérobie : glycolyse anaérobie**
 À partir du glycogène emmagasiné – Produit de l'acide lactique comme déchet (cycle de Krebs)

Le carburant **unique** de la contraction musculaire est **l'ATP**

Effort musculaire

Processus cyclique de dégradation et de resynthèse de l'ATP sous la dépendance de 3 séries de réactions chimiques :

- ✓ Processus **anaérobie alactique** (ATP, CP)
- ✓ Processus **anaérobie lactique** (glycolyse)
- ✓ Procéssus **aérobie** (oxydation)

✓ **Jusqu'à 2 mmol** de lactate sanguin, l'exercice est considéré comme purement aérobie; cette limite porte le nom de « **seuil aérobie** »

✓ A partir du seuil ainsi défini, toute augmentation de l'intensité de l'effort entraîne automatiquement une augmentation rapide de la lactatémie.

Résumé différentes filières énergétiques

Substrats	Anaérobie Alactique ATP CP	Anaérobie Lactique Glucides (glucoses et glycogène)	Aérobie Glucides Lipides Protéines (faible %) 1 à 3 minutes
Délai d'efficacité maximum	Nul	20 à 30 secondes	1 à 3 minutes
Puissance	Très élevée ++++	Elevée ++	Dépend du VO2 max
Temps d'épuisement à puissance maximale	2 à 3 secondes	25 à 40 secondes	3 à 15 mn
Capacité	Très Faible +	Faible +	Illimité +++++
Temps d'épuisement de la capacité (réserve)	Entre 7 et 20 secondes	2 minutes	Dépend du % du VO2 max utilisé
Facteurs limitants de l'exercice	Puissance : système enzymatique et neuro-musculaire. Capacité : baisse de la concentration des réserves de CP	Puissance : enzymes de la glycolyse anaérobie et nombre de fibres rapides Capacité : Baisse du pH musculaire	Puissance : fatigue musculaire locale Capacité : chute du taux du glycogène

Autres sources d'ATP

* These amounts are those typically stored by a 70-75 kilogram athlete.

Répartition aérobie-anaérobie

Epreuves	% ATP aérobie	% ATP anaérobie
100 m	< 5 %	> 95 %
200 m	10 %	90 %
400 m	25 %	75 %
800 m	50 %	50 %
1500 m	65 %	35 %
10 000 m	99 %	1 %
Marathon	100 %	0 %

A VO2 max on obtient un plateau pour lequel la consommation d'oxygène ne peut augmenter. Chez des athlètes hautement entraînés, le plateau peut être maintenu jusqu'à une dizaine de minutes.

LA FATIGUE :

« Amoindrissement de la capacité d'un muscle à générer une force ou une puissance »

Bigland-Ritchie & Woods, 1984

récupération musculaire ≠ réhabilitation

optimisation de la récupération musculaire

↓

- ✓ augmentation des charges d'entraînement
- ✓ diminution du risque de surentraînement
- ✓ diminution du risque de blessure

Quelques QCM

- <http://campusport.univ-lille2.fr/physio/co/activiteeval1.html>

L'os

Fonctions physiologiques de l'os

■ Mécanique

- soutien de l'organisme
- locomotion

■ Protection

- organes vitaux,
- moëlle (sang)

■ Métabolique

- réservoir d'ions Ca et PO_4

Structure macroscopique & microscopique

■ Organisation macroscopique, os cortical - os trabéculaire :

- mêmes éléments constitutifs (cellules, matrice, minéral)
- différences de structure et de fonction

■ Structure microscopique :

- os cortical compact : VO = 80-90%
- os trabéculaire -> réseau anastomotique
 - volume trabéculaire = 15-25%
 - surface trabéculaire > 80% de l'interface os-moëlle

■ Fonction : mécanique vs métabolique

Composition chimique de l'os

- ♣ Sels minéraux (65 à 70 %) : phosphate tricalcique, carbonate de calcium, fluorures, sulfates et chlorures.
- ♣ Substances organiques (30 à 35 %) : collagène, élastine, composants biochimiques des cellules et lipides du tissu adipeux (matrice ou tissu interstitiel).

Composition de l'os

Composition de l'os

Structure "type" d'un os long

- **Cartilage articulaire:** Consiste en cartilage hyaline recouvrant la surface de l'os que articule avec un autre os (p.e. fémur et tibia).
- **Épiphyse:** L'extrémité de l'os, une à chaque terminaison.
- **Plaque épiphysaire:** Région cartilagineuse comme "plaque de croissance".
- **Diaphyse:** La partie centrale. Elle consiste en un cylindre d'os compact relativement épais que renferme un canal médullaire central.

Structure de l'os long

- **diaphyse**
 - Elle consiste en un cylindre d'os compact relativement épais que renferme un canal médullaire central.
 - Dans l'âge adulte, le canal contient de la moelle osseuse jeune (riche en tissu adipeux).
- **épiphyse**
 - Couche fine d'os compact couvrant un intérieur d'os spongieux.
 - Le cartilage articulaire à chaque extrémité fonctionne comme un amortisseur et réducteur de friction lors du mouvement.

Structure de l'os long

- La surface extérieure de l'os est couverte d'une double membrane fine appelée **periosteum**.
 - Fibres extérieures de tissu connective dense et irrégulier.
 - Couche cellulaire intérieure contient des cellules ostéoprogéniteuses et ostéoblastes.
 - Le périoste est hautement riche en fibres nerveuses, capillaires vasculaires et lymphatiques.
 - Celles-ci rentrent le diaphyse de l'os via le **nutrient foramen**.
 - Le périoste est connecté à la matrice osseuse par des solides fibres de collagène.

Structure de l'os long

- La surface interne de l'os est recouverte d'une délicate membrane de tissu conjonctif appelé **endosteum**.
 - Couvre les trabécules d'os spongieux dans les cavités médullaires.
 - Contient des ostéoblastes et des ostéoclastes.

Vascularisation de l'os long

• Vascularisation artérielle des os longs

Artère nourricière divisée en 2 branches (ascendante et descendante) pour les extrémités supérieure et inférieure

Artère périostale diaphysaire qui irrigue la majeure partie de la corticale

Artère épiphysaire

• Vascularisation veineuse des os longs

Sinus veineux occupant la hauteur de la cavité médullaire

Structure microscopique de l'os compacte

- L'unité structurale de l'os compact et le **osteon, ou système Haversian.**
- Chaque osteon est un cylindre allongé orienté en parallèle à l'axe de l'os.

Structure microscopique de l'os compacte

- La région centrale de chaque osteon est désignée par **canal central ou Haversian.**
- Le canal contient des petits vaisseaux et fibres nerveuses que servent à entretenir les cellules de l'osteon.

Structure microscopique de l'os compacte

- Un osteon est un groupe de tubes creux de la matrice osseuse, les uns à côté des autres comme les anneaux de croissance du tronc d'un arbre.
- Chacun de ces tubes de la matrice est une **lamelle.**
- Les fibres de collagène de chaque lamelle sont disposées dans une même direction.

Structure microscopique de l'os compacte

Structure de l'os compacte

Structure microscopique de l'os compacte

L'os spongieux

- **L'os spongieux** est la partie interne poreuse de l'os, située sous la corticale de tissu compact. Ainsi appelée en raison de sa structure en éponge, faite de travées osseuses, la couche spongieuse offre en réalité une très grande résistance à l'écrasement.
- **Trabécules** ce sont les microfilaments de la microarchitecture osseuse que donnent un support fort à la structure de l'os spongieux. Elles se disposent irrégulièrement et ne contiennent pas de ostéons. Les nutriments sont fournies par la moelle osseuse.

L'os spongieux

Le tissu osseux

- Les ostéoblastes et la matrice osseuse
- Les ostéocytes
- Les ostéoclastes
- Le remodelage osseux et ses implications
- La perte osseuse du vieillissement

Matrice osseuse

- La matrice osseuse est constituée de matière organique (30-40%) et inorganique.
- La partie organique est composée de fibres de collagène (90-95%) et de plusieurs proteoglycans, glycosaminoglycans et glycoprotéines.
- Les fibres de collagène forment le cadre de la matrice osseuse et garantissent des propriétés de flexibilité et élasticité.

Matrice organique

95% : Collagène I
5% : Protéines non collagéniques :

Ostéocalcine : spécifique ostéoblaste
Dosable dans le sang
Témoigne du nombre d'ostéoblastes

Rôle des protéines non collagéniques :

- adhésion des cellules osseuses à la matrice
- faciliter ou inhiber la minéralisation
- lier les facteurs de croissance

Nombreux facteurs de croissances

Ostéogénèse imparfaite, maladie des os de verre

Mutation dans un des deux gènes codant pour le collagène de type I

Matrice osseuse

• La majorité de la matrice est constituée de cristaux inorganiques appelés *hydroxyapatite*, composée de *phosphate de calcium* et de carbonate de *calcium*.

• La **Hydroxyapatite** forme comme qu'un ciment qu'offre à l'os sa dureté et résistance.

• La combinaison de collagène et hydroxyapatite permet à l'os d'être fort et dure en garantissant une certaine flexibilité et élasticité.

Matrice : Phase minérale

1.2 kg de calcium, 600 gr de phosphore ⇒ rôle de réservoir

Majorité phosphate de calcium hydraté sous forme de cristal d'hydroxy-apatite.

Mécanisme de la minéralisation :

- apport de calcium et phosphore grâce à la phosphatase alcaline
- Rôle de protéines non collagéniques
- Phénomène actif sous la dépendance des ostéoblastes

Composition cellulaire de l'os

⇨ Ostéoblastes et ostéoclastes : construction et résorption osseuse

⇨ Ostéocytes : cellules osseuses

Os et cellules osseuses

Cellules osseuses

- **Ostéoblastes :**
 - cellule ostéoformatrice, origine mésenchymateuse
 - unités ostéoblastiques
- **Ostéocytes :**
 - englobés dans la matrice, dérivées des ostéoblastes
 - signaux matriciels et communication
- **Ostéoclastes :**
 - cellule de la résorption, origine hématopoïétique
 - 4 phases: attachement, acidification, protéolyse, inactivation (apoptose)

ostéoclastes

↑ **RÉSORPTION**
Hypogonadisme
Hyperparathyroïdie
Immobilisation
Inflammation...

ostéoblastes

↓ **FORMATION**
Vieillesse OBs
Corticoïdes
Dénutrition protidique
Amyotrophie
Tabac...

Ostéoblaste : synthétise et minéralise la matrice

ostéoblastes

- Deux gènes « clefs »
 - Runx2 : facteur de transcription indispensable à la différenciation
 - LRP5 : co-récepteur de la voie wnt dont l'activation (en inhibant GSK) induit le passage de la b-caténine dans le noyau et l'augmentation de plusieurs gènes de prolifération dont ceux des ostéoblastes

Rôle de Runx 2 dans la différenciation ostéoblastique

•Délétion du gène chez la souris :

sauvage Arrêt de la différenciation ostéoblastique et absence de tissu ossifié (Cell 1997)

Runx 2-/-

Lrp-5

Low-density lipoprotein Receptor-related Protein 5

- ✓ Données de clinique humaine
 - Inactivation du gène Lrp-5
→ syndrome ostéoporose pseudogliome (maladie récessive)
 - Mutation du gène Lrp-5 empêchant sa liaison à son inhibiteur naturel Dkk
→ Syndrome de masse osseuse élevée dans une famille
- ✓ Données expérimentales
 - Invalidation chez la souris : ostéoporose avec formation osseuse diminuées

Syndrme ostéoporose –pseudogliome (OPPG)

A B D

C E

Gong et coll., Cell, Nov 2001, 107: 513-523

Des mutations « activatrices » dans le gène de LRP5 sont responsables d'une masse osseuse élevée par augmentation de la formation osseuse

Boyden et coll, NEJM, Mai 2002, 346: 1516

Le tissu osseux

- Les ostéoblastes et la matrice osseuse
- Les ostéocytes
- Les ostéoclastes
- Le remodelage osseux et ses implications
- La perte osseuse du vieillissement

Ostéocytes

- Représentant 90% des cellules osseuses, emmurés dans le minéral et reliés par des canalicules
- Moyens d'étude : une lignée cellulaire MLO-Y4 et des souris invalidés pour certains gènes spécifiquement dans les ostéocytes
- Stade terminale de différenciation des ostéoblastes, marqueurs particuliers

Les marqueurs ostéocytaires

Viabilité et Apoptose des ostéocytes

- Mécano-senseurs : Effet positif des contraintes mécaniques
- Régulateurs du métabolisme phosphocalcique (FGF23 et PTH-R)
- et du remodelage osseux (RANKL et sclérostine)

Canalicules ostéocytaires et surface osseuse

Les ostéocytes : cellules sécrétrices

- FGF-23
- Sclérostine
- RANK-L

Sclérostine et formation osseuse

- Protéine avec expression que dans l'os
- Localisée dans les ostéocytes
- Inhibe la formation osseuse
- Inhibe la LRP5

Mutations inactivatrices de *Sost*

- Homozygotes
- Hétérozygotes

Le tissu osseux

- Les ostéoblastes et la matrice osseuse
- Les ostéocytes
- Les ostéoclastes
- Le remodelage osseux et ses implications
- La perte osseuse du vieillissement

Morphologie de l'ostéoclaste

Ostéoclastes

- Cellule très différenciée
- Fonction de dégradation extracellulaire dans un compartiment entre la bordure plissée et l'os (lysosome secondaire)
 - Adhésion au tissu osseux
 - Acidification extracellulaire
 - Sécrétion de protéases actives à PH acide (Cathepsine K)

Ostéopétrose : densité osseuse élevée due à défaut de résorption ostéoclastique

Défaut de fonction ostéoclastique : ostéopétrose bénigne

Défaut d'acidification
Absence de canal chlore

Défaut de synthèse de protéase :
cathepsine K

Ostéopétrose humaine récessive maligne

Défaut de résorption ostéoclastique sévère
Insuffisance médullaire
Léthale

Pre-transplant +7 weeks +22 weeks

Ostéoprotégérine chez l'homme : déficience et traitement

Ostéoporose sévère due à une mutation inactivatrice dans le gène de l'ostéoprotégérine : nombreux ostéoclastes

Injection sous cutanée d'ostéoprotégérine ⇒ Augmentation de la masse osseuse

Le tissu osseux

- Les ostéoblastes et la matrice osseuse
- Les ostéocytes
- Les ostéoclastes
- Le remodelage osseux et ses implications
- La perte osseuse du vieillissement

Tissu osseux

Cortical

Trabéculaire

Cortical

Le tissu osseux est formé de multiples « unités fonctionnelles »

Os trabéculaire

Os cortical

Os trabéculaire et cortical : activation différente des unités de remodelage

	Masse	Surface	Renouvelé chaque année
trabéculaire	20%	80%	25%
cortical	80%	20%	3%

Fréquence d'activation plus grande dans l'os trabéculaire que cortical → os trabéculaire = renouvellement plus important et plus réactif au changement de la balance

Remodelage osseux dépend de communications entre ostéoblastes et ostéoclastes

- Activation du remodelage :
 - Sécrétion par les ostéoblastes/ostéocytes d'un facteur (RANK-L) induisant la différenciation des ostéoclastes
- Couplage formation / résorption :
 - Libération de la matrice osseuse par les ostéoclastes de facteurs de croissance activant prolifération et différenciation ostéoblastique

Facteurs de croissance et os

- Ne sont pas spécifiques du tissu osseux : IGF-1, TGF- β , FGFs, GM-CSF, TGF- β , BMPs, (bone morphogenic protein)
- Facteurs solubles produits localement par les ostéoblastes et inclus dans la matrice osseuse
- Maintiennent leur activité biologique par leur liaison à des protéines de support
- Augmentent la prolifération et/ou la différenciation et des ostéoblastes

- Reference très riche sur <http://jcs.biologists.org/content/joces/124/7/991.full.pdf> (EN)

Facteurs modulant l'ostéoformation

- Facteurs de transcription de la différenciation Ob : Cbfa-1, Osx...
- Facteurs de croissance des Ob : IGF-1, TGF-β, BMPs...
- Agents hormonaux : PTH, estrogènes, leptine...
- Agents pharmacologiques : strontium...
- Récepteurs membranaires : LRP-5

Facteurs modulant la résorption osseuse

- Cytokines et facteurs de croissance :
 - cytokines monocytaires activatrices des Oc (IL-1, IL-6, IL-11, TNF-α...)
 - facteurs de croissance impliqués dans la différenciation des Oc (M-CSF...)
 - facteurs inhibant l'activité de résorption et stimulant l'apoptose Oc (TGF-β...)
- Ostéoprotégérine et RANK-ligand
- Hormones : calcitonine, estrogènes...
- Agents pharmacologiques : bisphosphonates, SERMs, Ac anti RANKL...

Grands mécanismes pathogéniques

Carence œstrogénique : conséquences osseuses

- Conséquences tissulaires, cellulaires, moléculaires
- Globalement :
 - hyper remodelage osseux
 - balance négative à chaque unité $\rightarrow$ perte osseuse
 - amincissement des travées et des corticales $\rightarrow$ perturbations micro architecturales.

Carence œstrogénique : conséquences cellulaires

- Ostéoclastes :
 - $\uparrow$ natalité
 - $\uparrow$ activité
 - $\downarrow$ apoptose
- Ostéoblastes/ostéocytes :
 - $\uparrow$ apoptose
 - $\downarrow$ activité OBs matures

Weitzmann et Pacifici, JCI, Mai 2006

Carence œstrogénique : conséquences tissulaires

- $\uparrow$ fréquence d'activation des unités multicellulaires osseuses $\rightarrow$ $\uparrow$ remodelage osseux (augmentation de l'espace de remodelage)
- $\uparrow$ résorption ostéoclastique :
 - $\uparrow$ volume érodé ($\uparrow$ surface érodée liée au nombre d'OCs & $\uparrow$ profondeur des lacunes liée à l'activité de chaque OC) sur toutes les enveloppes osseuses
 - $\uparrow$ résorption trabéculaire $\rightarrow$ $\uparrow$ écartement des travées
 - $\uparrow$ résorption endostéale et endocorticale $\rightarrow$ amincissement et $\uparrow$ porosité des corticales

Carence œstrogénique et résorption osseuse

	Menopausal status		% change	p
	Pre	Post		
n	24	27		
Trabecular surface	0.46	0.70	+ 48%	< 0.05
Endocortical surface	0.34	0.68	+106%	< 0.05
Intracortical surface	0.41	0.69	+68%	< 0.05
Combined total surface	0.44	0.69	+57%	< 0.02

Parfitt et al

Le tissu osseux

- Les ostéoblastes et la matrice osseuse
- Les ostéocytes
- Les ostéoclastes
- Le remodelage osseux et ses implications
- La perte osseuse du vieillissement

Vieillesse : conséquences osseuses

- Conséquences tissulaires, cellulaires, moléculaires
- Globalement :
 - amincissement des travées
 - aggravation des conséquences de l'hyperremodelage

Vieillesse : anomalies tissulaires

- Dans l'os trabéculaire :
 - ↓ épaisseur du mur ostéonique
 - ↓ épaisseur des travées → amincissement des travées
 - favorise les perforations et transforme les plaques en piliers → participation à la détérioration de la micro architecture trabéculaire
- Dans l'os cortical :
 - ↑ résorption et remodelage endocorticaux et endostéaux en relation avec l'hyperparathyroïdie secondaire chez les sujets âgés → amincissement et fragilisation des corticales.

Ostéon trabéculaire et mesure de l'épaisseur du mur ostéonique (MWTh)

Diminution de l'épaisseur du mur ostéonique avec l'âge Lips et al, Calcif Tissue Int 1978

Vieillesse : anomalies cellulaires

- ↓ natalité et prolifération des ostéoblastes
- ↑ adipogénèse et ↓ myélopoïèse
- ↓ ostéoclastogénèse
- ↑ apoptose des ostéocytes

Perte osseuse et IGF-1

- *Ammann et al (Osteoporosis Int 1996)* : perfusion d'IGF-1 pendant 6 sem
 - ↗ DMO trabéculaire et corticale
 - ↗ résistance mécanique
- *Schurch et al (Ann Intern Med 1998)* :
 - relation déficit alimentaire protidique/ taux IGF-1
 - correction du déficit protidique chez sujets âgés + Fx col récente ↘ taux IGF-1 et ↘ DMO col à 1 an.

Schurch et al, Ann Intern Med 1998

Schurch et al, Ann Intern Med 1998

Mais une RS récente...

Cochrane Library

Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in older people

Abstract

Older people with hip fractures are often malnourished at the time of fracture, and have poor food intake subsequently.

- "Weak evidence exists for the effectiveness of protein and energy feeds. Adequately sized randomised trials with robust methodology are required. In particular, the role of dietetic assistants, and peripheral venous feeding require further evaluation."

Périoste, épaisseur corticale et perte osseuse

- Évaluation de la masse osseuse et de la structure osseuse au radius distal chez 108 femmes suivies 19 ans à partir de la ménopause
- Constatations :
 - ↓ DMO, mais
 - ↑ surfaces endostée et périostée
 - ↓ index de résistance, MOINDRE QUE NE LE VOUDRAIT LA ↓ DE DMO

Ahlborg et al, NEJM, juillet 2003

Modèles animaux du vieillissement osseux

- Différents modèles animaux :
 - rat ou souris sénescents
 - manipulations génétiques : délétion ou surexpression génique
 - ovariectomie chez la rate, chien, singe, brebis
- Limites :
 - aucun modèle parfait
 - aucun animal ne présente de réelle ménopause
- Renseignements physiopathologiques et pharmacologiques.

Aspects cliniques du vieillissement osseux

- Évolution de la masse osseuse avec l'âge
 - quantification de la perte osseuse (globale / annuelle)
- Méthodes d'évaluation :
 - histomorphométrie
 - densitométrie
 - marqueurs biochimiques du remodelage
- Application à l'étude des médicaments :
 - anti-ostéoclastiques (bisphosphonates, SERMs, calcitonine, anti-RANKL...)
 - anaboliques ([fluor], PTH...)
 - « découplants » (ranélate de strontium).

Évolution de la masse osseuse avec l'âge

Perte osseuse du vieillissement

- Débute vers 50 ans et persiste au cours du vieillissement
- Est due à une résorption plus importante que la formation (déséquilibre du remodelage)
- Les femmes ont un capital osseux plus bas et perdent plus que les hommes lors du vieillissement (50 vs 30% d'os trabéculaire)
- La perte osseuse n'est pas symptomatique

Physiopathologie de la perte osseuse du vieillissement

- Facteurs endocriniens
 - Hyperparathyroïdie secondaire
 - Carence en estrogènes
- Diminution des stimulations mécaniques osseuses (ostéocytes)
 - masse musculaire diminuée
 - activité physique moindre
- Diminution de l'activité des ostéoblastes

Densitométrie osseuse

- Absorptiométrie biphotonique aux rayons X
 - technique de référence
 - mesure au rachis lombaire + hanche
- Mesure quantitative de la « densité osseuse » : dosage du minéral osseux
- Précision et reproductibilité satisfaisantes (à condition d'un contrôle qualité rigoureux et d'une formation)
- Très faible irradiation
- Bonne corrélation au risque de fracture.
- Utilisée en recherche clinique et dans les modèles expérimentaux.

Tableau récapitulatif des indications de l'ostéodensitométrie en pratique clinique

- Antécédent de fracture par fragilité osseuse
- Pathologie ostéopéniante (endocrinopathies) ou traitement ostéopéniant (corticoïdes, estrogéno- ou androgénoprivation)
- Chez la femme ménopausée en présence de facteurs de risque :
 - antécédent de fracture du col chez parent au 1^{er} degré
 - indice de masse corporelle < 19 kg/m²
 - ménopause avant 40 ans quelque soit la cause
 - antécédent de corticothérapie prolongée
- Arrêt d'un traitement anti-ostéoporotique
- Suivi d'une ostéoporose non traitée.

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Fractures ostéoporotiques

Les fractures passées sont un facteur de risque majeur de fracture future

Antécédent de fracture vertébrale

Risque de

Rapport d'incidence standardisé

Antécédent de Fx non vertébrale

Risque de

Rapport d'incidence standardisé

van Staa et al. Osteoporosis Int 2002;13:624-629

Mesure de DMO lombaire

Patient : [redacted]
 Date de naissance : 03/10/1932 75.0 ans
 Taille / Poids : 152.0 cm 60.0 kg
 Sexe / Ethnie : Femme Blanc

Médecin : [redacted]
 Médecin Prescripteur : [redacted]
 Mesuré : 03/10/2007 12:01:35 (10.50)
 Analysé : 03/10/2007 12:05:35 (10.50)

Rachis AP Densité osseuse

Référence : L2-L4

Région	DMO (g/cm³)	Adulte-Jeune (%)	1	2	3	Age-Egal (Age) (%)	Z-Score
L1	0.887	80	-1.9	108	0.6		
L2	0.858	73	-2.7	96	-0.3		
L3	0.918	78	-2.2	103	0.2		
L4	0.853	72	-2.7	96	-0.3		
L1-L2	0.871	75	-2.3	102	0.1		
L1-L3	0.868	77	-2.2	103	0.2		
L1-L4	0.878	76	-2.3	101	0.1		
L2-L3	0.888	75	-2.4	100	0.0		
L2-L4	0.876	74	-2.5	98	-0.1		

"T score" et "Z score"

+ 1 DS
 moyenne
 - 1 DS
 - 2,5 DS

Z score = - 1

T score = - 2,6

20 40 60 80

Définition de l'ostéoporose

- 1994 : définition densitométrique (OMS) → distinction entre "ostéopénie", "ostéoporose" et "ostéoporose confirmée" :

état normal	T score > -1
ostéopénie	-1 > T score > -2,5
ostéoporose	T score < -2,5
ostéoporose confirmée	T score < -2,5 + fracture(s)

Risque de fracture ostéoporotique

- Risque de fracture au cours de la vie à partir de 50 ans
- % de survie (IC95%) avec fracture (Melton et coll, 1992).

Fractures	Femmes	Hommes
fémorales	17,5 (16,8 - 18,2)	6,0 (5,6 - 6,5)
vertébrales	15,6 (14,8 - 16,3)	5,0 (4,6 - 5,4)
radiales	16,0 (15,2 - 16,7)	2,5 (2,2 - 3,1)
	39,7 (38,7 - 40,6)	13,1 (12,4 - 13,7)

DMO et risque de fracture

Site de mesure	Fracture			
	Avant bras	Hanche	Rachis	Toutes
Lombaire	1,5 (1,3 - 1,8)	1,6 (1,2 - 2,2)	2,3 (1,9 - 2,8)	1,5 (1,4 - 1,7)
Fémoral prox	1,4 (1,4 - 1,6)	2,6 (2,0 - 3,5)	1,8 (1,1 - 2,7)	1,6 (1,4 - 1,8)
Radial prox	1,8 (1,5 - 2,1)	2,1 (1,6 - 2,7)	2,2 (1,7 - 2,6)	1,5 (1,3 - 1,6)
Radial dist	1,7 (1,4 - 2,0)	1,8 (1,4 - 2,2)	1,7 (1,4 - 2,1)	1,4 (1,3 - 1,6)

Risque Relatif (IC 95%) pour -1 DS de DMO
Méta-analyse, Marshall et coll. 1996

Marqueurs biochimiques du remodelage osseux

■ Formation osseuse :

- phosphatases alcalines totales
- phosphatase alcaline osseuse
- ostéocalcine
- peptides d'extension du collagène de type I : PICP, PINP
- autres protéines non collagéniques

■ Résorption osseuse :

- hydroxyprolinurie
- phosphatase acide résistante au tartrate
- pyridinolinurie et deoxypyridinolinurie libre
- N- et C-télopeptides

Marqueurs biochimiques et physiopathologie de l'ostéoporose post-ménopausique

- Carence œstrogénique et augmentation du remodelage osseux (Stepan et al) → cinétique des marqueurs
- Corrélation négative DMO/remodelage de plus en plus forte avec ↑ âge (Garnero et al)

Stepan et al, Bone 1987

Évaluation clinique du risque de fracture

- Âge
- Antécédents de fracture post-méno (pré-méno)
- Mesure de DMO
- Facteurs cliniques de risque :
 - poids (BMI)
 - antécédents familiaux
 - corticothérapie
 - carences (œstrogènes, Ca, vit D, activité)
 - facteurs de risque de chute (sujets âgés)
- Marqueurs biochimiques ?

Les médicaments en fonction de leur mécanisme d'action

- Anti-ostéoclastiques**
estradiol, SERMs, bisphosphonates, calcium/D
- Anaboliques osseux**
(fluor) teriparatide
- Découplants « positifs »**
ranélate de strontium

État des lieux des traitements actuels : niveau de preuve d'efficacité

	Efficacité fractures vertébrales	Efficacité fractures périphériques	Efficacité fractures de hanche
calcium + vitamine D	ND(-?)	+/-	+
THS	+	+	+
raloxifene	+	-	-
alendronate, risédronate	+	+	+
ibandronate	+	-	-
acide zolédronique	+	+	+
tériparatide	+	+	-
PTH 1-84	+	-	-
ranélate de strontium	+	+	+

Mais il y a des alternatives + intéressantes...

The best exercises for building and maintaining strong bones are weight-bearing and muscle-strengthening activities. Weight-bearing exercises are any activity performed standing up, such as walking, running and dancing. When your feet and legs support your weight, your bones have to work harder, making them stronger. Muscle-strengthening exercises are any activity that requires your

Les régulateurs de la calcémie

- Hormone parathyroïdienne
 - Vitamine D
 - Calcitonine
-
- Récepteur au calcium
 - Récepteur de la parathormone

Vitamine D

- Source alimentaire et cutanée (hormone)
- Stéroïde .
- Métabolite actif synthétisé par hydroxylation dans le foie (forme circulante) et le rein
- Récepteur = facteur de transcription (récepteur nucléaire), présent dans l'intestin ++ et dans de nombreuses cellules à un taux plus faible

Source et métabolisme de la vitamine D

Vitamine D: multiples actions potentielles

Action biologique de la Vitamine D

- La forme circulante qui reflète les stocks de l'organisme est la 25(OH)D
 - Action biologique est due à la 1,25(OH)₂D₃ qui a la meilleur affinité pour le récepteur.
 - La 1 α hydroxylase rénale est stimulée par PTH et hypocalcémie
-
- Augmentation de l'absorption intestinale du calcium +++ → ↑ calcémie
 - Augmentation de la différenciation des cellules osseuses et autres (cutanées, hématopoïétique)
 - Diminue la transcription de l'hormone parathyroïdienne

Action biologique de la parathormone

- Rein :
 - ↑ hydroxylation en 1 α vitamine D →
 - ↑ absorption intestinale du calcium
 - ↑ réabsorption tubulaire du calcium → diminution calciurie
 - Cellules osseuses ↑ résorption osseuse
- Augmente la calcémie

Neoplasies

Réparation post